

表 1736 腹膜透析の経験 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	124 (96.9)	3 (2.3)	1 (0.8)	128 (100.0)		18	146
1.5～ (%)	620 (97.2)	9 (1.4)	9 (1.4)	638 (100.0)	8	125	771
2.0～ (%)	2,550 (97.1)	28 (1.1)	47 (1.8)	2,625 (100.0)	13	541	3,179
2.5～ (%)	9,736 (97.3)	71 (0.7)	204 (2.0)	10,011 (100.0)	92	2,047	12,150
3.0～ (%)	41,355 (97.0)	209 (0.5)	1,052 (2.5)	42,616 (100.0)	201	9,265	52,082
3.5～ (%)	84,238 (96.5)	375 (0.4)	2,660 (3.0)	87,273 (100.0)	270	19,592	107,135
4.0～ (%)	31,563 (96.1)	148 (0.5)	1,120 (3.4)	32,831 (100.0)	61	7,614	40,506
4.5～ (%)	1,846 (95.5)	13 (0.7)	74 (3.8)	1,933 (100.0)	4	425	2,362
5.0～ (%)	154 (98.7)		2 (1.3)	156 (100.0)		16	172
合計 (%)	172,186 (96.6)	856 (0.5)	5,169 (2.9)	178,211 (100.0)	649	39,643	218,503
記載なし (%)	6,119 (97.2)	31 (0.5)	146 (2.3)	6,296 (100.0)	76	4,096	10,468
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	3.60	3.52	3.67	3.60	3.40	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.54	0.41	0.44	0.49	0.43	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査