

表 1738 腹膜透析の経験 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	686 (95.8)	4 (0.6)	26 (3.6)	716 (100.0)	2	156	874
7.0～ (%)	1,023 (97.1)	3 (0.3)	28 (2.7)	1,054 (100.0)		212	1,266
7.5～ (%)	3,859 (97.1)	14 (0.4)	101 (2.5)	3,974 (100.0)	10	987	4,971
8.0～ (%)	12,707 (97.1)	57 (0.4)	327 (2.5)	13,091 (100.0)	33	3,166	16,290
8.4～ (%)	3,703 (96.6)	22 (0.6)	109 (2.8)	3,834 (100.0)	8	834	4,676
8.5～ (%)	42,509 (97.2)	154 (0.4)	1,082 (2.5)	43,745 (100.0)	152	10,005	53,902
9.0～ (%)	51,529 (96.6)	253 (0.5)	1,560 (2.9)	53,342 (100.0)	219	11,675	65,236
9.5～ (%)	33,490 (96.3)	201 (0.6)	1,103 (3.2)	34,794 (100.0)	120	7,490	42,404
10.0～ (%)	4,127 (95.3)	32 (0.7)	172 (4.0)	4,331 (100.0)	12	884	5,227
10.1～ (%)	10,461 (96.3)	58 (0.5)	347 (3.2)	10,866 (100.0)	42	2,369	13,277
10.5～ (%)	4,991 (95.6)	31 (0.6)	200 (3.8)	5,222 (100.0)	23	1,208	6,453
11.0～ (%)	1,675 (95.4)	14 (0.8)	67 (3.8)	1,756 (100.0)	11	398	2,165
11.5～ (%)	617 (96.4)	3 (0.5)	20 (3.1)	640 (100.0)	6	123	769
12.0～ (%)	431 (95.6)	4 (0.9)	16 (3.5)	451 (100.0)	3	85	539
合計 (%)	171,808 (96.6)	850 (0.5)	5,158 (2.9)	177,816 (100.0)	641	39,592	218,049
記載なし (%)	6,497 (97.1)	37 (0.6)	157 (2.3)	6,691 (100.0)	84	4,147	10,922
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	9.18	9.31	9.26	9.19	9.31	9.17	9.18
標準偏差	0.74	0.75	0.77	0.74	0.73	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査