

表 1740 腹膜透析の経験 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	7,588 (96.9)	31 (0.4)	209 (2.7)	7,828 (100.0)	27	1,657	9,512
20～ (%)	10,978 (97.1)	59 (0.5)	267 (2.4)	11,304 (100.0)	43	2,382	13,729
40～ (%)	11,540 (97.1)	45 (0.4)	305 (2.6)	11,890 (100.0)	39	2,596	14,525
60～ (%)	12,300 (96.9)	66 (0.5)	326 (2.6)	12,692 (100.0)	47	2,775	15,514
80～ (%)	12,385 (96.9)	71 (0.6)	321 (2.5)	12,777 (100.0)	46	2,848	15,671
100～ (%)	11,947 (96.4)	68 (0.5)	373 (3.0)	12,388 (100.0)	29	2,854	15,271
120～ (%)	11,431 (96.6)	60 (0.5)	348 (2.9)	11,839 (100.0)	49	2,698	14,586
140～ (%)	10,616 (96.7)	41 (0.4)	326 (3.0)	10,983 (100.0)	32	2,488	13,503
160～ (%)	9,536 (96.7)	43 (0.4)	281 (2.8)	9,860 (100.0)	29	2,218	12,107
180～ (%)	21,518 (96.7)	90 (0.4)	639 (2.9)	22,247 (100.0)	57	5,124	27,428
240～ (%)	261 (95.6)	4 (1.5)	8 (2.9)	273 (100.0)	1	64	338
241～ (%)	12,173 (96.3)	55 (0.4)	413 (3.3)	12,641 (100.0)	32	2,925	15,598
300～ (%)	7,061 (96.5)	38 (0.5)	219 (3.0)	7,318 (100.0)	15	1,659	8,992
360～ (%)	4,037 (96.6)	20 (0.5)	124 (3.0)	4,181 (100.0)	4	939	5,124
420～ (%)	2,350 (95.8)	14 (0.6)	90 (3.7)	2,454 (100.0)	4	566	3,024
480～ (%)	584 (95.4)	4 (0.7)	24 (3.9)	612 (100.0)	2	122	736
500～ (%)	917 (95.2)	8 (0.8)	38 (3.9)	963 (100.0)	2	224	1,189
540～ (%)	1,019 (96.8)	4 (0.4)	30 (2.8)	1,053 (100.0)	1	256	1,310
600～ (%)	1,646 (95.6)	13 (0.8)	63 (3.7)	1,722 (100.0)	3	407	2,132
800～ (%)	1,264 (94.8)	15 (1.1)	55 (4.1)	1,334 (100.0)	8	280	1,622
合計 (%)	151,151 (96.7)	749 (0.5)	4,459 (2.9)	156,359 (100.0)	470	35,082	191,911
記載なし (%)	3,561 (97.0)	24 (0.7)	86 (2.3)	3,671 (100.0)	72	932	4,675
総計 (%)	154,712 (96.7)	773 (0.5)	4,545 (2.8)	160,030 (100.0)	542	36,014	196,586
平均	169.10	187.19	184.80	169.63	155.36	171.67	169.97
標準偏差	159.93	203.14	184.52	160.95	175.81	160.86	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査