

表 1741 腹膜透析の経験 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,276 (95.9)	10 (0.8)	44 (3.3)	1,330 (100.0)	11	158	1,499
20～ (%)	1,593 (96.1)	9 (0.5)	55 (3.3)	1,657 (100.0)	9	182	1,848
35～ (%)	1,368 (95.6)	5 (0.3)	58 (4.1)	1,431 (100.0)	10	172	1,613
50～ (%)	2,103 (95.9)	10 (0.5)	81 (3.7)	2,194 (100.0)	5	260	2,459
75～ (%)	1,814 (96.1)	6 (0.3)	68 (3.6)	1,888 (100.0)	4	256	2,148
100～ (%)	1,507 (95.8)	5 (0.3)	61 (3.9)	1,573 (100.0)	9	205	1,787
125～ (%)	996 (95.6)	3 (0.3)	43 (4.1)	1,042 (100.0)	3	142	1,187
150～ (%)	30 (96.8)		1 (3.2)	31 (100.0)		6	37
151～ (%)	779 (94.2)	5 (0.6)	43 (5.2)	827 (100.0)	5	102	934
180～ (%)	570 (95.6)	3 (0.5)	23 (3.9)	596 (100.0)	3	67	666
210～ (%)	381 (95.3)	3 (0.8)	16 (4.0)	400 (100.0)	4	68	472
240～ (%)	423 (94.8)	5 (1.1)	18 (4.0)	446 (100.0)	4	76	526
300～ (%)	166 (93.8)		11 (6.2)	177 (100.0)	3	25	205
350～ (%)	112 (95.7)		5 (4.3)	117 (100.0)		18	135
400～ (%)	128 (96.2)		5 (3.8)	133 (100.0)	2	17	152
500～ (%)	124 (89.2)	1 (0.7)	14 (10.1)	139 (100.0)	9	18	166
合計 (%)	13,370 (95.6)	65 (0.5)	546 (3.9)	13,981 (100.0)	81	1,772	15,834
記載なし (%)	246 (94.6)	5 (1.9)	9 (3.5)	260 (100.0)	1	177	438
総計 (%)	13,616 (95.6)	70 (0.5)	555 (3.9)	14,241 (100.0)	82	1,949	16,272
平均	103.86	106.09	124.57	104.68	175.46	110.52	105.70
標準偏差	104.17	113.04	184.24	108.51	222.71	106.07	109.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査