

表 1743 腹膜透析の経験 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	5,133 (96.6)	18 (0.3)	161 (3.0)	5,312 (100.0)	32	1,110	6,454
100～ (%)	14,771 (97.0)	62 (0.4)	401 (2.6)	15,234 (100.0)	69	3,317	18,620
120～ (%)	27,061 (96.5)	149 (0.5)	841 (3.0)	28,051 (100.0)	116	6,148	34,315
140～ (%)	30,795 (96.6)	147 (0.5)	952 (3.0)	31,894 (100.0)	130	6,802	38,826
160～ (%)	25,079 (96.6)	112 (0.4)	781 (3.0)	25,972 (100.0)	97	5,514	31,583
180～ (%)	15,564 (96.4)	69 (0.4)	519 (3.2)	16,152 (100.0)	44	3,423	19,619
200～ (%)	7,992 (96.2)	51 (0.6)	269 (3.2)	8,312 (100.0)	24	1,873	10,209
220～ (%)	3,538 (97.1)	16 (0.4)	90 (2.5)	3,644 (100.0)	16	815	4,475
240～ (%)	1,387 (96.5)	6 (0.4)	45 (3.1)	1,438 (100.0)	4	291	1,733
260～ (%)	871 (97.3)	7 (0.8)	17 (1.9)	895 (100.0)	4	212	1,111
合計 (%)	132,191 (96.6)	637 (0.5)	4,076 (3.0)	136,904 (100.0)	536	29,505	166,945
記載なし (%)	46,114 (96.9)	250 (0.5)	1,239 (2.6)	47,603 (100.0)	189	14,234	62,026
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	154.68	155.93	155.27	154.70	150.05	154.86	154.71
標準偏差	35.26	35.60	34.44	35.24	35.70	35.49	35.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査