

表 1744 腹膜透析の経験 HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	531 (96.9)	4 (0.7)	13 (2.4)	548 (100.0)	3	120	671
20～ (%)	10,359 (97.0)	46 (0.4)	277 (2.6)	10,682 (100.0)	26	2,138	12,846
30～ (%)	29,609 (96.9)	126 (0.4)	817 (2.7)	30,552 (100.0)	82	6,254	36,888
40～ (%)	32,528 (96.6)	137 (0.4)	1,001 (3.0)	33,666 (100.0)	87	6,976	40,729
50～ (%)	23,021 (96.3)	114 (0.5)	771 (3.2)	23,906 (100.0)	84	5,090	29,080
60～ (%)	13,227 (95.9)	84 (0.6)	476 (3.5)	13,787 (100.0)	35	2,970	16,792
70～ (%)	6,408 (96.1)	31 (0.5)	227 (3.4)	6,666 (100.0)	13	1,522	8,201
80～ (%)	2,985 (96.0)	18 (0.6)	106 (3.4)	3,109 (100.0)	6	719	3,834
90～ (%)	1,310 (96.4)	5 (0.4)	44 (3.2)	1,359 (100.0)	5	369	1,733
100～ (%)	1,092 (96.0)	11 (1.0)	34 (3.0)	1,137 (100.0)	3	318	1,458
合計 (%)	121,070 (96.5)	576 (0.5)	3,766 (3.0)	125,412 (100.0)	344	26,476	152,232
記載なし (%)	57,235 (96.9)	311 (0.5)	1,549 (2.6)	59,095 (100.0)	381	17,263	76,739
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	48.04	50.02	49.47	48.10	47.85	49.01	48.25
標準偏差	16.34	17.83	16.45	16.36	15.92	17.39	16.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査