

表 1745 腹膜透析の経験 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| Non-HDL-C濃度 | なし                | あり(年末時点でカテーテルあり) | あり(年末時点でカテーテルなし) | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 50未満<br>(%) | 2,129<br>(96.4)   | 7<br>(0.3)       | 72<br>(3.3)      | 2,208<br>(100.0)   | 7      | 501    | 2,716   |
| 50～<br>(%)  | 10,169<br>(96.7)  | 47<br>(0.4)      | 303<br>(2.9)     | 10,519<br>(100.0)  | 26     | 2,361  | 12,906  |
| 70～<br>(%)  | 22,383<br>(96.4)  | 126<br>(0.5)     | 707<br>(3.0)     | 23,216<br>(100.0)  | 69     | 5,247  | 28,532  |
| 90～<br>(%)  | 26,535<br>(96.4)  | 140<br>(0.5)     | 841<br>(3.1)     | 27,516<br>(100.0)  | 79     | 5,984  | 33,579  |
| 110～<br>(%) | 21,259<br>(96.5)  | 95<br>(0.4)      | 686<br>(3.1)     | 22,040<br>(100.0)  | 63     | 4,576  | 26,679  |
| 130～<br>(%) | 12,850<br>(96.8)  | 55<br>(0.4)      | 376<br>(2.8)     | 13,281<br>(100.0)  | 31     | 2,821  | 16,133  |
| 150～<br>(%) | 6,359<br>(96.5)   | 36<br>(0.5)      | 198<br>(3.0)     | 6,593<br>(100.0)   | 15     | 1,435  | 8,043   |
| 170～<br>(%) | 2,833<br>(96.6)   | 14<br>(0.5)      | 87<br>(3.0)      | 2,934<br>(100.0)   | 10     | 623    | 3,567   |
| 190～<br>(%) | 1,067<br>(97.4)   | 6<br>(0.5)       | 22<br>(2.0)      | 1,095<br>(100.0)   | 2      | 241    | 1,338   |
| 210～<br>(%) | 644<br>(97.6)     | 2<br>(0.3)       | 14<br>(2.1)      | 660<br>(100.0)     | 1      | 171    | 832     |
| 合計<br>(%)   | 106,228<br>(96.5) | 528<br>(0.5)     | 3,306<br>(3.0)   | 110,062<br>(100.0) | 303    | 23,960 | 134,325 |
| 記載なし<br>(%) | 72,077<br>(96.8)  | 359<br>(0.5)     | 2,009<br>(2.7)   | 74,445<br>(100.0)  | 422    | 19,779 | 94,646  |
| 総計<br>(%)   | 178,305<br>(96.6) | 887<br>(0.5)     | 5,315<br>(2.9)   | 184,507<br>(100.0) | 725    | 43,739 | 228,971 |
| 平均          | 106.56            | 106.09           | 105.74           | 106.53             | 104.42 | 106.01 | 106.43  |
| 標準偏差        | 33.25             | 32.46            | 32.06            | 33.21              | 31.57  | 33.80  | 33.32   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査