

表 1746 腹膜透析の経験 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前収縮期血圧	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	22 (88.0)		3 (12.0)	25 (100.0)	1	9	35
60～ (%)	218 (96.9)		7 (3.1)	225 (100.0)		46	271
80～ (%)	1,883 (96.1)	15 (0.8)	62 (3.2)	1,960 (100.0)	8	409	2,377
100～ (%)	10,555 (96.6)	48 (0.4)	322 (2.9)	10,925 (100.0)	56	2,174	13,155
120～ (%)	33,267 (96.3)	161 (0.5)	1,107 (3.2)	34,535 (100.0)	128	6,913	41,576
140～ (%)	51,281 (96.4)	248 (0.5)	1,685 (3.2)	53,214 (100.0)	157	10,832	64,203
160～ (%)	37,391 (96.8)	177 (0.5)	1,072 (2.8)	38,640 (100.0)	133	8,070	46,843
180～ (%)	14,331 (96.9)	69 (0.5)	387 (2.6)	14,787 (100.0)	55	3,160	18,002
200～ (%)	3,622 (97.4)	9 (0.2)	87 (2.3)	3,718 (100.0)	8	789	4,515
220～ (%)	700 (96.2)	4 (0.5)	24 (3.3)	728 (100.0)	6	160	894
合計 (%)	153,270 (96.5)	731 (0.5)	4,756 (3.0)	158,757 (100.0)	552	32,562	191,871
記載なし (%)	25,035 (97.2)	156 (0.6)	559 (2.2)	25,750 (100.0)	173	11,177	37,100
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	151.60	150.52	150.27	151.55	150.14	152.11	151.64
標準偏差	24.00	23.94	23.53	23.99	25.98	24.12	24.02

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査