

表 1747 腹膜透析の経験 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前拡張期血圧	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	58 (96.7)		2 (3.3)	60 (100.0)		7	67
20～ (%)	467 (95.9)	2 (0.4)	18 (3.7)	487 (100.0)	2	123	612
40～ (%)	13,177 (97.2)	68 (0.5)	315 (2.3)	13,560 (100.0)	50	2,747	16,357
60～ (%)	72,015 (96.9)	296 (0.4)	2,039 (2.7)	74,350 (100.0)	278	14,997	89,625
80～ (%)	37,344 (96.3)	188 (0.5)	1,238 (3.2)	38,770 (100.0)	140	7,930	46,840
90～ (%)	19,841 (95.9)	116 (0.6)	730 (3.5)	20,687 (100.0)	47	4,214	24,948
100～ (%)	9,488 (95.6)	56 (0.6)	382 (3.8)	9,926 (100.0)	30	2,186	12,142
120～ (%)	581 (96.0)	4 (0.7)	20 (3.3)	605 (100.0)	3	133	741
140～ (%)	43 (97.7)		1 (2.3)	44 (100.0)		13	57
合計 (%)	153,014 (96.5)	730 (0.5)	4,745 (3.0)	158,489 (100.0)	550	32,350	191,389
記載なし (%)	25,291 (97.2)	157 (0.6)	570 (2.2)	26,018 (100.0)	175	11,389	37,582
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	77.44	79.12	79.54	77.51	76.50	77.83	77.56
標準偏差	14.35	14.86	14.50	14.36	14.09	14.51	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査