

表 1748 腹膜透析の経験 透析前脈拍(拍/分)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	125 (98.4)		2 (1.6)	127 (100.0)		28	155
40～ (%)	1,548 (97.1)	8 (0.5)	39 (2.4)	1,595 (100.0)	4	330	1,929
50～ (%)	12,790 (96.6)	64 (0.5)	391 (3.0)	13,245 (100.0)	47	2,481	15,773
60～ (%)	39,124 (96.3)	193 (0.5)	1,309 (3.2)	40,626 (100.0)	127	7,988	48,741
70～ (%)	46,876 (96.7)	231 (0.5)	1,384 (2.9)	48,491 (100.0)	134	9,559	58,184
80～ (%)	29,196 (96.5)	135 (0.4)	920 (3.0)	30,251 (100.0)	98	6,374	36,723
90～ (%)	12,752 (96.9)	47 (0.4)	355 (2.7)	13,154 (100.0)	43	2,721	15,918
100～ (%)	3,931 (96.0)	29 (0.7)	133 (3.2)	4,093 (100.0)	10	801	4,904
110～ (%)	913 (97.2)	4 (0.4)	22 (2.3)	939 (100.0)	3	215	1,157
120～ (%)	397 (97.5)	2 (0.5)	8 (2.0)	407 (100.0)		91	498
合計 (%)	147,652 (96.6)	713 (0.5)	4,563 (3.0)	152,928 (100.0)	466	30,588	183,982
記載なし (%)	30,653 (97.1)	174 (0.6)	752 (2.4)	31,579 (100.0)	259	13,151	44,989
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	74.45	74.18	74.10	74.44	74.08	74.80	74.50
標準偏差	12.81	12.91	12.49	12.80	12.37	12.80	12.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査