

表 1750 腹膜透析の経験 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 年齢 | なし | あり(年末時点でカテーテルあり) | あり(年末時点でカテーテルなし) | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 15歳未満 (%) | 2 (100.0) | | | 2 (100.0) | | | 2 |
| 15歳～ (%) | 109 (82.6) | 4 (3.0) | 19 (14.4) | 132 (100.0) | | 30 | 162 |
| 30歳～ (%) | 1,871 (91.9) | 20 (1.0) | 146 (7.2) | 2,037 (100.0) | 11 | 440 | 2,488 |
| 45歳～ (%) | 6,973 (93.6) | 44 (0.6) | 435 (5.8) | 7,452 (100.0) | 36 | 1,685 | 9,173 |
| 60歳～ (%) | 14,616 (95.3) | 66 (0.4) | 655 (4.3) | 15,337 (100.0) | 62 | 3,615 | 19,014 |
| 75歳～ (%) | 6,937 (98.0) | 10 (0.1) | 134 (1.9) | 7,081 (100.0) | 35 | 1,638 | 8,754 |
| 90歳～ (%) | 276 (99.3) | | 2 (0.7) | 278 (100.0) | 2 | 70 | 350 |
| 合計 (%) | 30,784 (95.3) | 144 (0.4) | 1,391 (4.3) | 32,319 (100.0) | 146 | 7,478 | 39,943 |
| 不明 (%) | 3 (100.0) | | | 3 (100.0) | | | 3 |
| 記載なし (%) | | | | | | | |
| 総計 (%) | 30,787 (95.3) | 144 (0.4) | 1,391 (4.3) | 32,322 (100.0) | 146 | 7,478 | 39,946 |
| 平均 | 65.18 | 58.19 | 59.77 | 64.92 | 64.36 | 65.25 | 64.98 |
| 標準偏差 | 12.33 | 12.81 | 12.22 | 12.38 | 13.14 | 12.34 | 12.38 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査