

表 1751 腹膜透析の経験 透析歴(年)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	3,978 (99.1)	8 (0.2)	30 (0.7)	4,016 (100.0)	14	934	4,964
2年～ (%)	6,913 (97.3)	24 (0.3)	168 (2.4)	7,105 (100.0)	30	1,480	8,615
5年～ (%)	7,792 (95.3)	30 (0.4)	356 (4.4)	8,178 (100.0)	33	1,905	10,116
10年～ (%)	4,707 (93.7)	32 (0.6)	286 (5.7)	5,025 (100.0)	20	1,149	6,194
15年～ (%)	2,866 (91.7)	20 (0.6)	240 (7.7)	3,126 (100.0)	23	775	3,924
20年～ (%)	1,945 (91.7)	16 (0.8)	161 (7.6)	2,122 (100.0)	7	508	2,637
25年～ (%)	1,225 (93.4)	5 (0.4)	81 (6.2)	1,311 (100.0)	7	333	1,651
30年～ (%)	850 (96.2)	5 (0.6)	29 (3.3)	884 (100.0)	6	233	1,123
35年～ (%)	426 (93.4)	2 (0.4)	28 (6.1)	456 (100.0)	3	128	587
40年～ (%)	81 (85.3)	2 (2.1)	12 (12.6)	95 (100.0)	2	27	124
合計 (%)	30,783 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,318 (100.0)	145	7,472	39,935
不明 (%)	4 (100.0)			4 (100.0)	1	6	11
記載なし (%)							
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	9.76	12.63	13.36	9.93	11.54	10.40	10.02
標準偏差	8.78	9.17	8.57	8.80	10.07	9.10	8.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査