

表 1752 腹膜透析の経験 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

| 原疾患                  | なし               | あり(年末時点でカテーテルあり) | あり(年末時点でカテーテルなし) | 合計                | 不明  | 記載なし  | 総計     |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-------|--------|
| 慢性糸球体腎炎<br>(%)       | 11,302<br>(92.8) | 69<br>(0.6)      | 812<br>(6.7)     | 12,183<br>(100.0) | 56  | 2,837 | 15,076 |
| 慢性腎盂腎炎<br>(%)        | 325<br>(93.4)    | 2<br>(0.6)       | 21<br>(6.0)      | 348<br>(100.0)    | 1   | 73    | 422    |
| 急速進行性糸球体腎炎<br>(%)    | 213<br>(94.2)    | 1<br>(0.4)       | 12<br>(5.3)      | 226<br>(100.0)    | 1   | 57    | 284    |
| 妊娠腎/妊娠中毒症<br>(%)     | 256<br>(94.5)    | 3<br>(1.1)       | 12<br>(4.4)      | 271<br>(100.0)    | 2   | 86    | 359    |
| その他の分類不能の腎炎<br>(%)   | 146<br>(91.8)    | 1<br>(0.6)       | 12<br>(7.5)      | 159<br>(100.0)    |     | 36    | 195    |
| 多発性嚢胞腎<br>(%)        | 1,149<br>(97.1)  | 3<br>(0.3)       | 31<br>(2.6)      | 1,183<br>(100.0)  | 6   | 275   | 1,464  |
| 腎硬化症<br>(%)          | 2,267<br>(97.0)  | 9<br>(0.4)       | 60<br>(2.6)      | 2,336<br>(100.0)  | 17  | 533   | 2,886  |
| 悪性高血圧<br>(%)         | 238<br>(94.4)    | 1<br>(0.4)       | 13<br>(5.2)      | 252<br>(100.0)    | 1   | 59    | 312    |
| 糖尿病性腎症<br>(%)        | 10,492<br>(97.7) | 27<br>(0.3)      | 219<br>(2.0)     | 10,738<br>(100.0) | 45  | 2,390 | 13,173 |
| SLE腎炎<br>(%)         | 287<br>(94.7)    | 1<br>(0.3)       | 15<br>(5.0)      | 303<br>(100.0)    | 1   | 59    | 363    |
| アミロイド腎<br>(%)        | 49<br>(94.2)     | 1<br>(1.9)       | 2<br>(3.8)       | 52<br>(100.0)     |     | 7     | 59     |
| 痛風腎<br>(%)           | 114<br>(90.5)    | 1<br>(0.8)       | 11<br>(8.7)      | 126<br>(100.0)    | 1   | 27    | 154    |
| 先天性代謝異常による腎不全<br>(%) | 30<br>(85.7)     | 1<br>(2.9)       | 4<br>(11.4)      | 35<br>(100.0)     |     | 9     | 44     |
| 腎・尿路結核<br>(%)        | 18<br>(94.7)     |                  | 1<br>(5.3)       | 19<br>(100.0)     |     | 3     | 22     |
| 腎・尿路結石<br>(%)        | 52<br>(98.1)     |                  | 1<br>(1.9)       | 53<br>(100.0)     |     | 16    | 69     |
| 腎・尿路腫瘍<br>(%)        | 69<br>(94.5)     |                  | 4<br>(5.5)       | 73<br>(100.0)     |     | 12    | 85     |
| 閉塞性尿路障害<br>(%)       | 55<br>(96.5)     |                  | 2<br>(3.5)       | 57<br>(100.0)     |     | 17    | 74     |
| 骨髄腫<br>(%)           | 17<br>(100.0)    |                  |                  | 17<br>(100.0)     |     | 2     | 19     |
| 腎形成不全<br>(%)         | 65<br>(85.5)     | 2<br>(2.6)       | 9<br>(11.8)      | 76<br>(100.0)     | 2   | 23    | 101    |
| 不明<br>(%)            | 2,673<br>(95.8)  | 16<br>(0.6)      | 101<br>(3.6)     | 2,790<br>(100.0)  | 11  | 679   | 3,480  |
| 再導入<br>(%)           | 319<br>(92.5)    | 2<br>(0.6)       | 24<br>(7.0)      | 345<br>(100.0)    |     | 71    | 416    |
| その他<br>(%)           | 651<br>(95.7)    | 4<br>(0.6)       | 25<br>(3.7)      | 680<br>(100.0)    | 2   | 207   | 889    |
| 合計<br>(%)            | 30,787<br>(95.3) | 144<br>(0.4)     | 1,391<br>(4.3)   | 32,322<br>(100.0) | 146 | 7,478 | 39,946 |
| 記載なし<br>(%)          |                  |                  |                  |                   |     |       |        |
| 総計<br>(%)            | 30,787<br>(95.3) | 144<br>(0.4)     | 1,391<br>(4.3)   | 32,322<br>(100.0) | 146 | 7,478 | 39,946 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査