

表 1753 腹膜透析の経験 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	36		1	37		5	42
(%)	(97.3)		(2.7)	(100.0)			
私立大学	123	2	13	138		35	173
(%)	(89.1)	(1.4)	(9.4)	(100.0)			
国立	24	1	5	30		6	36
(%)	(80.0)	(3.3)	(16.7)	(100.0)			
県市町村立	1,226	10	93	1,329	2	442	1,773
(%)	(92.2)	(0.8)	(7.0)	(100.0)			
社会保険	207	4	20	231		88	319
(%)	(89.6)	(1.7)	(8.7)	(100.0)			
厚生連	727	2	50	779	32	202	1,013
(%)	(93.3)	(0.3)	(6.4)	(100.0)			
その他公的	496	2	58	556	20	118	694
(%)	(89.2)	(0.4)	(10.4)	(100.0)			
私立総合	895	6	28	929	4	160	1,093
(%)	(96.3)	(0.6)	(3.0)	(100.0)			
私立	7,567	27	265	7,859	80	2,076	10,015
(%)	(96.3)	(0.3)	(3.4)	(100.0)			
私立診療所	19,486	90	858	20,434	8	4,346	24,788
(%)	(95.4)	(0.4)	(4.2)	(100.0)			
総計	30,787	144	1,391	32,322	146	7,478	39,946
(%)	(95.3)	(0.4)	(4.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査