

表 1755 腹膜透析の経験 透析時間(時間/回)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満 (%)	59 (96.7)		2 (3.3)	61 (100.0)		31	92
3.0～ (%)	1,818 (98.3)	2 (0.1)	29 (1.6)	1,849 (100.0)	12	421	2,282
3.5～ (%)	1,896 (97.5)	5 (0.3)	44 (2.3)	1,945 (100.0)	10	524	2,479
4.0～ (%)	20,480 (95.6)	92 (0.4)	840 (3.9)	21,412 (100.0)	98	4,924	26,434
4.5～ (%)	2,981 (93.0)	21 (0.7)	202 (6.3)	3,204 (100.0)	19	625	3,848
5.0～ (%)	3,013 (91.8)	20 (0.6)	250 (7.6)	3,283 (100.0)	7	742	4,032
5.5～ (%)	171 (91.4)	3 (1.6)	13 (7.0)	187 (100.0)		31	218
6.0～ (%)	240 (96.4)	1 (0.4)	8 (3.2)	249 (100.0)		35	284
6.5～ (%)	14 (100.0)			14 (100.0)		3	17
7.0～ (%)	29 (93.5)		2 (6.5)	31 (100.0)		5	36
合計 (%)	30,701 (95.2)	144 (0.4)	1,390 (4.3)	32,235 (100.0)	146	7,341	39,722
記載なし (%)	86 (98.9)		1 (1.1)	87 (100.0)		137	224
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	4.09	4.24	4.26	4.10	4.04	4.09	4.10
標準偏差	0.50	0.48	0.51	0.51	0.45	0.49	0.50

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査