

表 1756 腹膜透析の経験 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	1 (100.0)			1 (100.0)			1
100～ (%)	26 (96.3)		1 (3.7)	27 (100.0)		10	37
120～ (%)	79 (95.2)		4 (4.8)	83 (100.0)		11	94
140～ (%)	1,082 (98.3)	4 (0.4)	15 (1.4)	1,101 (100.0)	5	236	1,342
160～ (%)	463 (96.9)	1 (0.2)	14 (2.9)	478 (100.0)	5	95	578
180～ (%)	2,268 (97.0)	4 (0.2)	67 (2.9)	2,339 (100.0)	9	598	2,946
200～ (%)	10,585 (96.3)	25 (0.2)	379 (3.4)	10,989 (100.0)	59	2,499	13,547
220～ (%)	5,171 (94.5)	43 (0.8)	260 (4.7)	5,474 (100.0)	21	1,112	6,607
240～ (%)	6,874 (93.9)	48 (0.7)	397 (5.4)	7,319 (100.0)	41	1,767	9,127
260～ (%)	869 (94.9)	4 (0.4)	43 (4.7)	916 (100.0)	2	160	1,078
280～ (%)	786 (93.0)	4 (0.5)	55 (6.5)	845 (100.0)		175	1,020
300～ (%)	1,958 (93.8)	10 (0.5)	119 (5.7)	2,087 (100.0)	4	374	2,465
350～ (%)	264 (93.0)		20 (7.0)	284 (100.0)		61	345
400～ (%)	149 (93.1)		11 (6.9)	160 (100.0)		42	202
合計 (%)	30,575 (95.2)	143 (0.4)	1,385 (4.3)	32,103 (100.0)	146	7,140	39,389
記載なし (%)	212 (96.8)	1 (0.5)	6 (2.7)	219 (100.0)		338	557
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	223.94	232.17	234.24	224.42	217.19	223.23	224.18
標準偏差	40.52	32.18	40.91	40.56	31.76	39.54	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査