

表 1757 腹膜透析の経験 身長(cm)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

身長	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
130未満 (%)	31 (91.2)	1 (2.9)	2 (5.9)	34 (100.0)		4	38
130～ (%)	51 (96.2)		2 (3.8)	53 (100.0)		17	70
135～ (%)	243 (97.6)		6 (2.4)	249 (100.0)	1	39	289
140～ (%)	927 (95.7)	4 (0.4)	38 (3.9)	969 (100.0)	5	189	1,163
145～ (%)	2,363 (96.2)	10 (0.4)	84 (3.4)	2,457 (100.0)	6	532	2,995
150～ (%)	4,153 (95.2)	14 (0.3)	195 (4.5)	4,362 (100.0)	25	825	5,212
155～ (%)	4,809 (95.3)	13 (0.3)	225 (4.5)	5,047 (100.0)	24	1,008	6,079
160～ (%)	5,711 (95.5)	19 (0.3)	250 (4.2)	5,980 (100.0)	28	1,169	7,177
165～ (%)	5,326 (94.6)	41 (0.7)	263 (4.7)	5,630 (100.0)	25	1,067	6,722
170～ (%)	3,787 (94.6)	26 (0.6)	191 (4.8)	4,004 (100.0)	19	762	4,785
175～ (%)	1,437 (95.2)	7 (0.5)	65 (4.3)	1,509 (100.0)	5	272	1,786
180～ (%)	399 (94.1)	2 (0.5)	23 (5.4)	424 (100.0)	1	68	493
185～ (%)	59 (92.2)		5 (7.8)	64 (100.0)		13	77
190～ (%)	7 (87.5)		1 (12.5)	8 (100.0)		1	9
合計 (%)	29,303 (95.2)	137 (0.4)	1,350 (4.4)	30,790 (100.0)	139	5,966	36,895
記載なし (%)	1,484 (96.9)	7 (0.5)	41 (2.7)	1,532 (100.0)	7	1,512	3,051
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	160.74	162.82	161.45	160.78	160.55	160.51	160.74
標準偏差	9.55	9.64	9.73	9.56	9.01	9.42	9.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査