

表 1758 腹膜透析の経験 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満	8			8	1	3	12
(%)	(100.0)			(100.0)			
20～	53	2	2	57		19	76
(%)	(93.0)	(3.5)	(3.5)	(100.0)			
30～	2,072	11	91	2,174	13	495	2,682
(%)	(95.3)	(0.5)	(4.2)	(100.0)			
40～	7,767	28	352	8,147	43	1,815	10,005
(%)	(95.3)	(0.3)	(4.3)	(100.0)			
50～	9,709	45	467	10,221	40	2,229	12,490
(%)	(95.0)	(0.4)	(4.6)	(100.0)			
60～	6,541	32	302	6,875	22	1,468	8,365
(%)	(95.1)	(0.5)	(4.4)	(100.0)			
70～	2,694	17	112	2,823	11	589	3,423
(%)	(95.4)	(0.6)	(4.0)	(100.0)			
80～	1,035	4	32	1,071	2	200	1,273
(%)	(96.6)	(0.4)	(3.0)	(100.0)			
90～	353	1	14	368	1	86	455
(%)	(95.9)	(0.3)	(3.8)	(100.0)			
100～	110		4	114	1	27	142
(%)	(96.5)		(3.5)	(100.0)			
110～	47	1		48		13	61
(%)	(97.9)	(2.1)		(100.0)			
120～	30		1	31		6	37
(%)	(96.8)		(3.2)	(100.0)			
合計	30,419	141	1,377	31,937	134	6,950	39,021
(%)	(95.2)	(0.4)	(4.3)	(100.0)			
記載なし	368	3	14	385	12	528	925
(%)	(95.6)	(0.8)	(3.6)	(100.0)			
総計	30,787	144	1,391	32,322	146	7,478	39,946
(%)	(95.3)	(0.4)	(4.3)	(100.0)			
平均	56.74	57.14	56.09	56.71	53.93	56.30	56.63
標準偏差	13.06	13.38	12.10	13.03	13.48	13.04	13.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査