

表 1759 腹膜透析の経験 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	80 (95.2)		4 (4.8)	84 (100.0)		13	97
0.0～ (%)	1,039 (95.2)	6 (0.5)	46 (4.2)	1,091 (100.0)	6	223	1,320
1.0～ (%)	5,708 (94.8)	30 (0.5)	280 (4.7)	6,018 (100.0)	28	1,354	7,400
2.0～ (%)	11,378 (94.7)	44 (0.4)	599 (5.0)	12,021 (100.0)	61	2,572	14,654
3.0～ (%)	6,195 (94.5)	35 (0.5)	323 (4.9)	6,553 (100.0)	18	1,443	8,014
4.0～ (%)	1,707 (94.9)	14 (0.8)	77 (4.3)	1,798 (100.0)	6	387	2,191
5.0～ (%)	299 (93.7)	4 (1.3)	16 (5.0)	319 (100.0)		81	400
6.0～ (%)	49 (96.1)		2 (3.9)	51 (100.0)		8	59
7.0～ (%)	12 (100.0)			12 (100.0)		4	16
8.0～ (%)	23 (95.8)		1 (4.2)	24 (100.0)		6	30
合計 (%)	26,490 (94.7)	133 (0.5)	1,348 (4.8)	27,971 (100.0)	119	6,091	34,181
記載なし (%)	315 (95.2)	3 (0.9)	13 (3.9)	331 (100.0)	12	447	790
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	2.57	2.69	2.58	2.57	2.40	2.58	2.57
標準偏差	1.02	1.12	1.00	1.02	0.84	1.10	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査