

表 1760 腹膜透析の経験 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	474 (95.8)	2 (0.4)	19 (3.8)	495 (100.0)	2	90	587
1.0～ (%)	849 (95.9)	4 (0.5)	32 (3.6)	885 (100.0)	3	203	1,091
2.0～ (%)	2,347 (94.1)	15 (0.6)	133 (5.3)	2,495 (100.0)	9	526	3,030
3.0～ (%)	5,414 (95.5)	20 (0.4)	234 (4.1)	5,668 (100.0)	25	1,200	6,893
4.0～ (%)	7,246 (94.5)	33 (0.4)	388 (5.1)	7,667 (100.0)	34	1,676	9,377
5.0～ (%)	5,710 (94.1)	29 (0.5)	328 (5.4)	6,067 (100.0)	31	1,326	7,424
6.0～ (%)	2,835 (94.7)	16 (0.5)	142 (4.7)	2,993 (100.0)	12	720	3,725
7.0～ (%)	1,102 (95.0)	10 (0.9)	48 (4.1)	1,160 (100.0)	2	246	1,408
8.0～ (%)	341 (93.4)	3 (0.8)	21 (5.8)	365 (100.0)	1	70	436
9.0～ (%)	158 (98.1)	1 (0.6)	2 (1.2)	161 (100.0)		29	190
合計 (%)	26,476 (94.7)	133 (0.5)	1,347 (4.8)	27,956 (100.0)	119	6,086	34,161
記載なし (%)	329 (95.1)	3 (0.9)	14 (4.0)	346 (100.0)	12	452	810
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	4.58	4.78	4.62	4.59	4.50	4.61	4.59
標準偏差	1.60	1.79	1.51	1.59	1.38	1.55	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査