

表 1761 腹膜透析の経験 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
14未満 (%)	118 (95.9)	1 (0.8)	4 (3.3)	123 (100.0)	1	25	149
14～ (%)	796 (94.4)	3 (0.4)	44 (5.2)	843 (100.0)	5	198	1,046
16～ (%)	3,127 (94.7)	17 (0.5)	158 (4.8)	3,302 (100.0)	18	678	3,998
18～ (%)	6,029 (94.7)	31 (0.5)	306 (4.8)	6,366 (100.0)	38	1,210	7,614
20～ (%)	6,666 (94.7)	30 (0.4)	343 (4.9)	7,039 (100.0)	27	1,396	8,462
22～ (%)	5,255 (95.3)	29 (0.5)	228 (4.1)	5,512 (100.0)	16	1,043	6,571
24～ (%)	3,313 (95.9)	9 (0.3)	134 (3.9)	3,456 (100.0)	4	628	4,088
26～ (%)	1,771 (96.3)	9 (0.5)	60 (3.3)	1,840 (100.0)	7	350	2,197
28～ (%)	965 (96.4)	4 (0.4)	32 (3.2)	1,001 (100.0)	4	172	1,177
30～ (%)	839 (97.0)	2 (0.2)	24 (2.8)	865 (100.0)	6	146	1,017
合計 (%)	28,879 (95.2)	135 (0.4)	1,333 (4.4)	30,347 (100.0)	126	5,846	36,319
記載なし (%)	1,908 (96.6)	9 (0.5)	58 (2.9)	1,975 (100.0)	20	1,632	3,627
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	21.72	21.30	21.25	21.70	21.04	21.53	21.67
標準偏差	3.66	3.54	3.37	3.65	3.97	3.61	3.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査