

表 1762 腹膜透析の経験 透析前BUN(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	31 (100.0)			31 (100.0)		8	39
20～ (%)	254 (94.8)		14 (5.2)	268 (100.0)	1	40	309
30～ (%)	1,301 (95.2)	7 (0.5)	59 (4.3)	1,367 (100.0)	8	278	1,653
40～ (%)	3,764 (95.6)	18 (0.5)	155 (3.9)	3,937 (100.0)	16	832	4,785
50～ (%)	6,484 (94.8)	31 (0.5)	325 (4.8)	6,840 (100.0)	29	1,449	8,318
60～ (%)	6,893 (95.0)	25 (0.3)	340 (4.7)	7,258 (100.0)	23	1,523	8,804
70～ (%)	4,625 (94.0)	32 (0.7)	263 (5.3)	4,920 (100.0)	30	1,136	6,086
80～ (%)	2,188 (93.9)	10 (0.4)	131 (5.6)	2,329 (100.0)	10	492	2,831
90～ (%)	788 (93.7)	9 (1.1)	44 (5.2)	841 (100.0)	4	206	1,051
100～ (%)	204 (94.9)		11 (5.1)	215 (100.0)		64	279
110～ (%)	52 (86.7)	1 (1.7)	7 (11.7)	60 (100.0)		14	74
120～ (%)	15 (93.8)		1 (6.3)	16 (100.0)		4	20
合計 (%)	26,599 (94.7)	133 (0.5)	1,350 (4.8)	28,082 (100.0)	121	6,046	34,249
記載なし (%)	206 (93.6)	3 (1.4)	11 (5.0)	220 (100.0)	10	492	722
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	62.04	64.26	63.70	62.13	62.20	62.71	62.23
標準偏差	15.04	15.91	15.30	15.06	15.01	15.21	15.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査