

表 1763 腹膜透析の経験 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	3 (100.0)			3 (100.0)			3
2～ (%)	117 (97.5)	1 (0.8)	2 (1.7)	120 (100.0)		27	147
4～ (%)	729 (98.8)	1 (0.1)	8 (1.1)	738 (100.0)	6	174	918
6～ (%)	2,988 (97.4)	5 (0.2)	74 (2.4)	3,067 (100.0)	19	664	3,750
8～ (%)	6,880 (95.4)	33 (0.5)	295 (4.1)	7,208 (100.0)	38	1,501	8,747
10～ (%)	7,920 (94.7)	29 (0.3)	410 (4.9)	8,359 (100.0)	29	1,759	10,147
12～ (%)	5,060 (93.0)	42 (0.8)	338 (6.2)	5,440 (100.0)	20	1,178	6,638
14～ (%)	2,110 (92.2)	16 (0.7)	162 (7.1)	2,288 (100.0)	8	524	2,820
16～ (%)	772 (92.1)	6 (0.7)	60 (7.2)	838 (100.0)	1	209	1,048
合計 (%)	26,579 (94.7)	133 (0.5)	1,349 (4.8)	28,061 (100.0)	121	6,036	34,218
記載なし (%)	226 (93.8)	3 (1.2)	12 (5.0)	241 (100.0)	10	502	753
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	10.67	11.57	11.51	10.71	10.07	10.77	10.72
標準偏差	2.65	2.67	2.48	2.65	2.51	2.72	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査