

表 1764 腹膜透析の経験 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	14 (100.0)			14 (100.0)		5	19
0.4～ (%)	15 (93.8)		1 (6.3)	16 (100.0)		3	19
0.6～ (%)	68 (95.8)	1 (1.4)	2 (2.8)	71 (100.0)		13	84
0.8～ (%)	491 (97.2)	3 (0.6)	11 (2.2)	505 (100.0)		113	618
1.0～ (%)	2,288 (96.2)	10 (0.4)	80 (3.4)	2,378 (100.0)	9	529	2,916
1.2～ (%)	5,886 (95.6)	27 (0.4)	243 (3.9)	6,156 (100.0)	25	1,325	7,506
1.4～ (%)	7,049 (94.7)	36 (0.5)	360 (4.8)	7,445 (100.0)	37	1,490	8,972
1.6～ (%)	5,181 (94.3)	25 (0.5)	287 (5.2)	5,493 (100.0)	27	1,153	6,673
1.8～ (%)	2,725 (93.4)	15 (0.5)	179 (6.1)	2,919 (100.0)	13	608	3,540
2.0～ (%)	1,891 (91.7)	12 (0.6)	159 (7.7)	2,062 (100.0)	5	501	2,568
合計 (%)	25,608 (94.6)	129 (0.5)	1,322 (4.9)	27,059 (100.0)	116	5,740	32,915
記載なし (%)	1,197 (96.3)	7 (0.6)	39 (3.1)	1,243 (100.0)	15	798	2,056
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	1.54	1.56	1.61	1.54	1.55	1.54	1.54
標準偏差	0.31	0.32	0.32	0.31	0.25	0.32	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査