

表 1765 腹膜透析の経験 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	14 (100.0)			14 (100.0)		6	20
0.4～ (%)	34 (91.9)		3 (8.1)	37 (100.0)		7	44
0.6～ (%)	266 (96.7)	3 (1.1)	6 (2.2)	275 (100.0)		61	336
0.8～ (%)	1,754 (96.9)	4 (0.2)	53 (2.9)	1,811 (100.0)	4	396	2,211
1.0～ (%)	5,886 (95.9)	30 (0.5)	222 (3.6)	6,138 (100.0)	26	1,338	7,502
1.2～ (%)	7,945 (94.7)	40 (0.5)	403 (4.8)	8,388 (100.0)	42	1,709	10,139
1.4～ (%)	5,526 (94.1)	27 (0.5)	322 (5.5)	5,875 (100.0)	32	1,223	7,130
1.6～ (%)	2,590 (93.3)	16 (0.6)	171 (6.2)	2,777 (100.0)	9	586	3,372
1.8～ (%)	959 (91.6)	5 (0.5)	83 (7.9)	1,047 (100.0)	2	243	1,292
2.0～ (%)	647 (90.7)	4 (0.6)	62 (8.7)	713 (100.0)	1	176	890
合計 (%)	25,621 (94.6)	129 (0.5)	1,325 (4.9)	27,075 (100.0)	116	5,745	32,936
記載なし (%)	1,184 (96.5)	7 (0.6)	36 (2.9)	1,227 (100.0)	15	793	2,035
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	1.34	1.37	1.42	1.35	1.34	1.35	1.35
標準偏差	0.29	0.30	0.30	0.29	0.21	0.30	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査