

表 1767 腹膜透析の経験 %クレアチニン産生速度(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,333 (98.4)	4 (0.3)	18 (1.3)	1,355 (100.0)	6	273	1,634
60～ (%)	1,104 (95.8)	6 (0.5)	42 (3.6)	1,152 (100.0)	9	243	1,404
70～ (%)	1,974 (96.5)	7 (0.3)	65 (3.2)	2,046 (100.0)	12	420	2,478
80～ (%)	3,090 (95.5)	21 (0.6)	123 (3.8)	3,234 (100.0)	16	618	3,868
90～ (%)	3,986 (94.7)	17 (0.4)	204 (4.8)	4,207 (100.0)	29	864	5,100
100～ (%)	4,480 (94.1)	18 (0.4)	262 (5.5)	4,760 (100.0)	25	1,049	5,834
110～ (%)	4,150 (93.4)	26 (0.6)	265 (6.0)	4,441 (100.0)	11	947	5,399
120～ (%)	2,952 (93.5)	14 (0.4)	190 (6.0)	3,156 (100.0)	5	682	3,843
130～ (%)	1,582 (93.7)	10 (0.6)	96 (5.7)	1,688 (100.0)	1	403	2,092
140～ (%)	989 (93.7)	6 (0.6)	61 (5.8)	1,056 (100.0)	2	250	1,308
合計 (%)	25,640 (94.6)	129 (0.5)	1,326 (4.9)	27,095 (100.0)	116	5,749	32,960
記載なし (%)	1,165 (96.5)	7 (0.6)	35 (2.9)	1,207 (100.0)	15	789	2,011
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	101.46	103.72	107.20	101.75	93.58	102.89	101.92
標準偏差	23.85	24.07	20.66	23.74	19.99	24.53	23.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査