

表 1768 腹膜透析の経験 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	6 (75.0)		2 (25.0)	8 (100.0)		2	10
1.5～ (%)	47 (92.2)	1 (2.0)	3 (5.9)	51 (100.0)		11	62
2.0～ (%)	241 (98.0)		5 (2.0)	246 (100.0)	2	46	294
2.5～ (%)	1,070 (95.7)	4 (0.4)	44 (3.9)	1,118 (100.0)	7	267	1,392
3.0～ (%)	6,945 (96.1)	34 (0.5)	247 (3.4)	7,226 (100.0)	25	1,556	8,807
3.5～ (%)	16,164 (95.2)	78 (0.5)	742 (4.4)	16,984 (100.0)	51	3,550	20,585
4.0～ (%)	5,599 (94.4)	23 (0.4)	307 (5.2)	5,929 (100.0)	17	1,212	7,158
4.5～ (%)	261 (96.0)	1 (0.4)	10 (3.7)	272 (100.0)		45	317
5.0～ (%)	14 (87.5)		2 (12.5)	16 (100.0)		2	18
合計 (%)	30,347 (95.3)	141 (0.4)	1,362 (4.3)	31,850 (100.0)	102	6,691	38,643
記載なし (%)	440 (93.2)	3 (0.6)	29 (6.1)	472 (100.0)	44	787	1,303
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	3.64	3.61	3.68	3.64	3.57	3.63	3.64
標準偏差	0.39	0.38	0.38	0.39	0.42	0.39	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査