

表 1769 腹膜透析の経験 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前CRP濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	16,384 (95.2)	80 (0.5)	746 (4.3)	17,210 (100.0)	62	3,432	20,704
0.2～ (%)	5,147 (95.3)	17 (0.3)	236 (4.4)	5,400 (100.0)	14	1,063	6,477
0.5～ (%)	2,488 (95.3)	14 (0.5)	110 (4.2)	2,612 (100.0)	6	555	3,173
1.0～ (%)	1,549 (95.1)	9 (0.6)	71 (4.4)	1,629 (100.0)	4	370	2,003
2.0～ (%)	899 (95.0)	5 (0.5)	42 (4.4)	946 (100.0)	2	186	1,134
4.0～ (%)	308 (94.5)	4 (1.2)	14 (4.3)	326 (100.0)	1	80	407
6.0～ (%)	135 (95.1)	1 (0.7)	6 (4.2)	142 (100.0)		29	171
8.0～ (%)	61 (95.3)		3 (4.7)	64 (100.0)	2	28	94
10.0～ (%)	87 (97.8)		2 (2.2)	89 (100.0)		19	108
15.0～ (%)	68 (95.8)		3 (4.2)	71 (100.0)		13	84
合計 (%)	27,126 (95.2)	130 (0.5)	1,233 (4.3)	28,489 (100.0)	91	5,775	34,355
記載なし (%)	3,661 (95.5)	14 (0.4)	158 (4.1)	3,833 (100.0)	55	1,703	5,591
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	0.55	0.55	0.53	0.55	0.51	0.58	0.55
標準偏差	1.76	1.11	1.61	1.76	1.43	1.78	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査