

表 1770 腹膜透析の経験 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	132 (95.0)		7 (5.0)	139 (100.0)		21	160
7.0～ (%)	203 (94.0)	4 (1.9)	9 (4.2)	216 (100.0)		43	259
7.5～ (%)	721 (94.5)	5 (0.7)	37 (4.8)	763 (100.0)	4	184	951
8.0～ (%)	2,247 (95.6)	11 (0.5)	92 (3.9)	2,350 (100.0)	8	510	2,868
8.4～ (%)	651 (94.2)	4 (0.6)	36 (5.2)	691 (100.0)		127	818
8.5～ (%)	7,374 (95.6)	29 (0.4)	313 (4.1)	7,716 (100.0)	24	1,561	9,301
9.0～ (%)	9,140 (95.5)	42 (0.4)	388 (4.1)	9,570 (100.0)	31	1,914	11,515
9.5～ (%)	5,877 (94.8)	27 (0.4)	294 (4.7)	6,198 (100.0)	19	1,395	7,612
10.0～ (%)	697 (95.3)	1 (0.1)	33 (4.5)	731 (100.0)	2	170	903
10.1～ (%)	1,894 (94.9)	12 (0.6)	89 (4.5)	1,995 (100.0)	6	451	2,452
10.5～ (%)	915 (95.3)	4 (0.4)	41 (4.3)	960 (100.0)	5	205	1,170
11.0～ (%)	296 (95.8)		13 (4.2)	309 (100.0)	2	72	383
11.5～ (%)	98 (92.5)	2 (1.9)	6 (5.7)	106 (100.0)	1	25	132
12.0～ (%)	58 (96.7)		2 (3.3)	60 (100.0)		11	71
合計 (%)	30,303 (95.3)	141 (0.4)	1,360 (4.3)	31,804 (100.0)	102	6,689	38,595
記載なし (%)	484 (93.4)	3 (0.6)	31 (6.0)	518 (100.0)	44	789	1,351
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	9.18	9.16	9.21	9.18	9.26	9.21	9.19
標準偏差	0.75	0.81	0.74	0.75	0.77	0.75	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査