

表 1772 腹膜透析の経験 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	なし	あり(年末時点でカテ テルあり)	あり(年末時点でカテ テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,328 (94.9)	4 (0.3)	67 (4.8)	1,399 (100.0)	7	277	1,683
20～ (%)	1,720 (95.9)	5 (0.3)	68 (3.8)	1,793 (100.0)	12	390	2,195
40～ (%)	1,892 (94.5)	6 (0.3)	105 (5.2)	2,003 (100.0)	12	422	2,437
60～ (%)	2,031 (95.8)	7 (0.3)	81 (3.8)	2,119 (100.0)	6	467	2,592
80～ (%)	2,274 (96.1)	11 (0.5)	81 (3.4)	2,366 (100.0)	4	476	2,846
100～ (%)	2,178 (94.9)	9 (0.4)	109 (4.7)	2,296 (100.0)	7	492	2,795
120～ (%)	2,026 (95.7)	10 (0.5)	82 (3.9)	2,118 (100.0)	8	455	2,581
140～ (%)	1,839 (95.0)	12 (0.6)	84 (4.3)	1,935 (100.0)	1	387	2,323
160～ (%)	1,692 (95.5)	6 (0.3)	74 (4.2)	1,772 (100.0)	3	375	2,150
180～ (%)	3,938 (95.7)	25 (0.6)	151 (3.7)	4,114 (100.0)	11	880	5,005
240～ (%)	62 (95.4)		3 (4.6)	65 (100.0)	1	11	77
241～ (%)	2,336 (95.1)	16 (0.7)	104 (4.2)	2,456 (100.0)	2	497	2,955
300～ (%)	1,322 (94.9)	6 (0.4)	65 (4.7)	1,393 (100.0)	6	315	1,714
360～ (%)	801 (95.4)	2 (0.2)	37 (4.4)	840 (100.0)	1	201	1,042
420～ (%)	435 (95.0)	1 (0.2)	22 (4.8)	458 (100.0)	3	130	591
480～ (%)	112 (94.1)		7 (5.9)	119 (100.0)		27	146
500～ (%)	163 (93.7)	1 (0.6)	10 (5.7)	174 (100.0)	2	61	237
540～ (%)	191 (94.6)	1 (0.5)	10 (5.0)	202 (100.0)		50	252
600～ (%)	320 (95.5)	1 (0.3)	14 (4.2)	335 (100.0)	1	87	423
800～ (%)	269 (93.7)	5 (1.7)	13 (4.5)	287 (100.0)	1	62	350
合計 (%)	26,929 (95.3)	128 (0.5)	1,187 (4.2)	28,244 (100.0)	88	6,062	34,394
記載なし (%)	552 (97.2)		16 (2.8)	568 (100.0)	17	149	734
総計 (%)	27,481 (95.4)	128 (0.4)	1,203 (4.2)	28,812 (100.0)	105	6,211	35,128
平均	176.03	205.56	180.69	176.36	155.81	181.76	177.26
標準偏差	168.97	184.83	189.40	169.96	159.11	167.17	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査