

表 1773 腹膜透析の経験 PTH値(pg/mL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	201 (94.4)	2 (0.9)	10 (4.7)	213 (100.0)		36	249
20～ (%)	236 (92.9)		18 (7.1)	254 (100.0)	1	46	301
35～ (%)	228 (95.8)	1 (0.4)	9 (3.8)	238 (100.0)	1	35	274
50～ (%)	349 (94.3)	1 (0.3)	20 (5.4)	370 (100.0)		74	444
75～ (%)	316 (92.9)	1 (0.3)	23 (6.8)	340 (100.0)	1	50	391
100～ (%)	253 (92.7)	1 (0.4)	19 (7.0)	273 (100.0)		58	331
125～ (%)	177 (89.8)	3 (1.5)	17 (8.6)	197 (100.0)	1	36	234
150～ (%)	4 (100.0)			4 (100.0)			4
151～ (%)	171 (90.5)	1 (0.5)	17 (9.0)	189 (100.0)		26	215
180～ (%)	111 (94.1)		7 (5.9)	118 (100.0)		19	137
210～ (%)	71 (88.8)		9 (11.3)	80 (100.0)		18	98
240～ (%)	69 (94.5)		4 (5.5)	73 (100.0)		15	88
300～ (%)	33 (97.1)		1 (2.9)	34 (100.0)		8	42
350～ (%)	24 (92.3)		2 (7.7)	26 (100.0)		3	29
400～ (%)	18 (94.7)		1 (5.3)	19 (100.0)		5	24
500～ (%)	37 (88.1)		5 (11.9)	42 (100.0)		3	45
合計 (%)	2,298 (93.0)	10 (0.4)	162 (6.6)	2,470 (100.0)	4	432	2,906
記載なし (%)	6 (100.0)			6 (100.0)		25	31
総計 (%)	2,304 (93.1)	10 (0.4)	162 (6.5)	2,476 (100.0)	4	457	2,937
平均	111.33	91.00	126.88	112.27	69.75	109.43	111.79
標準偏差	109.50	59.25	124.09	110.40	50.49	94.46	108.12

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査