

表 1774 腹膜透析の経験 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン 濃度	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
5未満	20		2	22	2	2	26
(%)	(90.9)		(9.1)	(100.0)			
5～	29		1	30		1	31
(%)	(96.7)		(3.3)	(100.0)			
6～	92	1	4	97	1	16	114
(%)	(94.8)	(1.0)	(4.1)	(100.0)			
7～	370		13	383		62	445
(%)	(96.6)		(3.4)	(100.0)			
8～	1,324	3	43	1,370	19	248	1,637
(%)	(96.6)	(0.2)	(3.1)	(100.0)			
9～	4,590	22	188	4,800	34	1,016	5,850
(%)	(95.6)	(0.5)	(3.9)	(100.0)			
10～	10,065	38	422	10,525	41	2,381	12,947
(%)	(95.6)	(0.4)	(4.0)	(100.0)			
11～	9,043	50	433	9,526	21	2,030	11,577
(%)	(94.9)	(0.5)	(4.5)	(100.0)			
12～	3,442	17	179	3,638	12	732	4,382
(%)	(94.6)	(0.5)	(4.9)	(100.0)			
13～	919	5	55	979	3	203	1,185
(%)	(93.9)	(0.5)	(5.6)	(100.0)			
14～	411	3	26	440	1	82	523
(%)	(93.4)	(0.7)	(5.9)	(100.0)			
合計	30,305	139	1,366	31,810	134	6,773	38,717
(%)	(95.3)	(0.4)	(4.3)	(100.0)			
記載なし	482	5	25	512	12	705	1,229
(%)	(94.1)	(1.0)	(4.9)	(100.0)			
総計	30,787	144	1,391	32,322	146	7,478	39,946
(%)	(95.3)	(0.4)	(4.3)	(100.0)			
平均	10.83	11.05	10.98	10.84	10.19	10.85	10.84
標準偏差	1.27	1.31	1.31	1.28	1.49	1.20	1.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査