

表 1775 腹膜透析の経験 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	804 (96.6)	3 (0.4)	25 (3.0)	832 (100.0)	3	157	992
100～ (%)	2,322 (95.7)	10 (0.4)	95 (3.9)	2,427 (100.0)	11	550	2,988
120～ (%)	4,448 (95.6)	19 (0.4)	188 (4.0)	4,655 (100.0)	18	1,021	5,694
140～ (%)	5,469 (95.2)	24 (0.4)	249 (4.3)	5,742 (100.0)	11	1,152	6,905
160～ (%)	4,706 (94.7)	26 (0.5)	240 (4.8)	4,972 (100.0)	21	1,018	6,011
180～ (%)	3,013 (94.4)	12 (0.4)	166 (5.2)	3,191 (100.0)	12	670	3,873
200～ (%)	1,751 (93.8)	7 (0.4)	109 (5.8)	1,867 (100.0)	10	376	2,253
220～ (%)	736 (93.2)	5 (0.6)	49 (6.2)	790 (100.0)	2	164	956
240～ (%)	289 (93.5)		20 (6.5)	309 (100.0)		75	384
260～ (%)	148 (94.9)		8 (5.1)	156 (100.0)		60	216
合計 (%)	23,686 (95.0)	106 (0.4)	1,149 (4.6)	24,941 (100.0)	88	5,243	30,272
記載なし (%)	7,101 (96.2)	38 (0.5)	242 (3.3)	7,381 (100.0)	58	2,235	9,674
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	157.66	158.17	163.30	157.92	156.76	158.41	158.00
標準偏差	35.46	33.39	35.75	35.48	34.31	36.72	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査