

表 1776 腹膜透析の経験 HDL-C濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

HDL-C濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	66 (98.5)		1 (1.5)	67 (100.0)		14	81
20～ (%)	1,477 (96.3)	5 (0.3)	52 (3.4)	1,534 (100.0)	1	339	1,874
30～ (%)	4,908 (95.9)	19 (0.4)	191 (3.7)	5,118 (100.0)	6	1,007	6,131
40～ (%)	5,802 (95.5)	21 (0.3)	255 (4.2)	6,078 (100.0)	2	1,280	7,360
50～ (%)	4,672 (95.3)	28 (0.6)	201 (4.1)	4,901 (100.0)	3	1,067	5,971
60～ (%)	3,029 (94.7)	9 (0.3)	160 (5.0)	3,198 (100.0)	1	658	3,857
70～ (%)	1,527 (94.0)	6 (0.4)	91 (5.6)	1,624 (100.0)	1	398	2,023
80～ (%)	773 (93.6)	6 (0.7)	47 (5.7)	826 (100.0)	1	186	1,013
90～ (%)	321 (94.7)	1 (0.3)	17 (5.0)	339 (100.0)		92	431
100～ (%)	280 (93.6)		19 (6.4)	299 (100.0)		84	383
合計 (%)	22,855 (95.3)	95 (0.4)	1,034 (4.3)	23,984 (100.0)	15	5,125	29,124
記載なし (%)	7,932 (95.1)	49 (0.6)	357 (4.3)	8,338 (100.0)	131	2,353	10,822
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	50.57	51.53	53.20	50.69	47.33	51.63	50.85
標準偏差	17.01	14.90	18.09	17.05	16.85	17.76	17.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査