

表 1777 腹膜透析の経験 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

Non-HDL-C濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	428 (96.6)	3 (0.7)	12 (2.7)	443 (100.0)		86	529
50～ (%)	1,843 (95.7)	5 (0.3)	78 (4.0)	1,926 (100.0)	1	476	2,403
70～ (%)	4,032 (95.2)	17 (0.4)	188 (4.4)	4,237 (100.0)	2	899	5,138
90～ (%)	4,922 (95.3)	21 (0.4)	223 (4.3)	5,166 (100.0)	2	1,097	6,265
110～ (%)	4,019 (95.1)	20 (0.5)	186 (4.4)	4,225 (100.0)	2	935	5,162
130～ (%)	2,463 (94.5)	8 (0.3)	135 (5.2)	2,606 (100.0)	1	542	3,149
150～ (%)	1,232 (93.9)	12 (0.9)	68 (5.2)	1,312 (100.0)		285	1,597
170～ (%)	537 (95.2)	1 (0.2)	26 (4.6)	564 (100.0)		118	682
190～ (%)	199 (96.6)		7 (3.4)	206 (100.0)		56	262
210～ (%)	99 (95.2)		5 (4.8)	104 (100.0)		37	141
合計 (%)	19,774 (95.1)	87 (0.4)	928 (4.5)	20,789 (100.0)	8	4,531	25,328
記載なし (%)	11,013 (95.5)	57 (0.5)	463 (4.0)	11,533 (100.0)	138	2,947	14,618
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	106.95	109.30	109.51	107.07	99.88	107.35	107.12
標準偏差	33.22	32.04	32.15	33.17	27.38	34.30	33.37

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査