

表 1778 腹膜透析の経験 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)			2 (100.0)			2
60～ (%)	93 (96.9)	1 (1.0)	2 (2.1)	96 (100.0)		19	115
80～ (%)	498 (95.8)	4 (0.8)	18 (3.5)	520 (100.0)	5	90	615
100～ (%)	2,201 (94.9)	11 (0.5)	108 (4.7)	2,320 (100.0)	6	474	2,800
120～ (%)	6,008 (94.9)	22 (0.3)	304 (4.8)	6,334 (100.0)	30	1,275	7,639
140～ (%)	8,946 (94.7)	46 (0.5)	457 (4.8)	9,449 (100.0)	45	1,939	11,433
160～ (%)	6,538 (95.8)	22 (0.3)	265 (3.9)	6,825 (100.0)	20	1,463	8,308
180～ (%)	2,491 (96.0)	7 (0.3)	96 (3.7)	2,594 (100.0)	20	540	3,154
200～ (%)	635 (95.3)	5 (0.8)	26 (3.9)	666 (100.0)	4	152	822
220～ (%)	169 (96.6)	2 (1.1)	4 (2.3)	175 (100.0)	2	39	216
合計 (%)	27,581 (95.2)	120 (0.4)	1,280 (4.4)	28,981 (100.0)	132	5,991	35,104
記載なし (%)	3,206 (96.0)	24 (0.7)	111 (3.3)	3,341 (100.0)	14	1,487	4,842
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	150.59	149.42	148.82	150.51	151.62	151.41	150.67
標準偏差	25.08	29.03	23.41	25.03	27.05	25.03	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査