

表 1779 腹膜透析の経験 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前拡張期血圧	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満(%)	5 (100.0)			5 (100.0)		2	7
20~(%)	91 (94.8)	1 (1.0)	4 (4.2)	96 (100.0)	3	22	121
40~(%)	2,151 (96.4)	9 (0.4)	72 (3.2)	2,232 (100.0)	11	437	2,680
60~(%)	11,872 (95.5)	38 (0.3)	516 (4.2)	12,426 (100.0)	62	2,484	14,972
80~(%)	7,034 (95.0)	35 (0.5)	338 (4.6)	7,407 (100.0)	20	1,576	9,003
90~(%)	4,160 (94.5)	24 (0.5)	219 (5.0)	4,403 (100.0)	19	895	5,317
100~(%)	2,068 (93.9)	13 (0.6)	121 (5.5)	2,202 (100.0)	16	483	2,701
120~(%)	137 (95.1)		7 (4.9)	144 (100.0)	1	24	169
140~(%)	10 (100.0)			10 (100.0)		2	12
合計(%)	27,528 (95.2)	120 (0.4)	1,277 (4.4)	28,925 (100.0)	132	5,925	34,982
記載なし(%)	3,259 (95.9)	24 (0.7)	114 (3.4)	3,397 (100.0)	14	1,553	4,964
総計(%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	79.00	81.40	80.87	79.10	78.23	79.56	79.17
標準偏差	14.70	15.26	14.36	14.69	16.91	14.71	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査