

表 1780 腹膜透析の経験 透析前脈拍(拍/分)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	14 (93.3)		1 (6.7)	15 (100.0)		2	17
40～ (%)	259 (99.6)		1 (0.4)	260 (100.0)	2	33	295
50～ (%)	2,073 (94.8)	8 (0.4)	105 (4.8)	2,186 (100.0)	10	436	2,632
60～ (%)	6,643 (95.3)	25 (0.4)	306 (4.4)	6,974 (100.0)	36	1,480	8,490
70～ (%)	8,292 (95.2)	46 (0.5)	370 (4.2)	8,708 (100.0)	38	1,799	10,545
80～ (%)	5,501 (95.2)	24 (0.4)	252 (4.4)	5,777 (100.0)	23	1,263	7,063
90～ (%)	2,586 (95.6)	9 (0.3)	111 (4.1)	2,706 (100.0)	9	578	3,293
100～ (%)	816 (95.6)	4 (0.5)	34 (4.0)	854 (100.0)	2	186	1,042
110～ (%)	197 (92.5)	1 (0.5)	15 (7.0)	213 (100.0)		48	261
120～ (%)	86 (96.6)		3 (3.4)	89 (100.0)	1	16	106
合計 (%)	26,467 (95.3)	117 (0.4)	1,198 (4.3)	27,782 (100.0)	121	5,841	33,744
記載なし (%)	4,320 (95.2)	27 (0.6)	193 (4.3)	4,540 (100.0)	25	1,637	6,202
総計 (%)	30,787 (95.3)	144 (0.4)	1,391 (4.3)	32,322 (100.0)	146	7,478	39,946
平均	75.37	75.69	75.52	75.38	73.49	75.70	75.43
標準偏差	12.97	11.80	12.99	12.97	12.25	12.78	12.93

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査