

表 1793 腎移植の回数 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前アルブミン濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	155 (98.7)	2 (1.3)				157 (100.0)		28	185
1.5～ (%)	805 (99.6)	3 (0.4)				808 (100.0)	6	175	989
2.0～ (%)	3,249 (99.2)	24 (0.7)	2 (0.1)			3,275 (100.0)	22	764	4,061
2.5～ (%)	12,381 (99.4)	68 (0.5)	5 (0.0)			12,454 (100.0)	81	2,901	15,436
3.0～ (%)	52,474 (99.0)	480 (0.9)	36 (0.1)	3 (0.0)		52,993 (100.0)	227	12,888	66,108
3.5～ (%)	106,697 (98.7)	1,299 (1.2)	67 (0.1)	4 (0.0)		108,067 (100.0)	317	26,851	135,235
4.0～ (%)	39,561 (98.3)	644 (1.6)	22 (0.1)	1 (0.0)		40,228 (100.0)	83	10,197	50,508
4.5～ (%)	2,309 (97.8)	50 (2.1)	2 (0.1)			2,361 (100.0)	3	550	2,914
5.0～ (%)	178 (97.8)	4 (2.2)				182 (100.0)		21	203
合計 (%)	217,809 (98.8)	2,574 (1.2)	134 (0.1)	8 (0.0)		220,525 (100.0)	739	54,375	275,639
記載なし (%)	8,360 (99.0)	76 (0.9)	5 (0.1)	1 (0.0)		8,442 (100.0)	180	25,847	34,469
総計 (%)	226,169 (98.8)	2,650 (1.2)	139 (0.1)	9 (0.0)		228,967 (100.0)	919	80,222	310,108
平均	3.59	3.70	3.60	3.50		3.60	3.43	3.60	3.60
標準偏差	0.44	0.42	0.41	0.33		0.44	0.48	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査