

表 1803 腎移植の回数 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮 期血圧	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	27 (93.1)	2 (6.9)				29 (100.0)		11	40
60～ (%)	342 (97.7)	7 (2.0)	1 (0.3)			350 (100.0)		83	433
80～ (%)	2,670 (98.1)	46 (1.7)	7 (0.3)			2,723 (100.0)	13	602	3,338
100～ (%)	14,109 (98.2)	254 (1.8)	9 (0.1)			14,372 (100.0)	56	3,179	17,607
120～ (%)	42,701 (98.5)	592 (1.4)	44 (0.1)	4 (0.0)		43,341 (100.0)	149	9,781	53,271
140～ (%)	64,688 (98.7)	797 (1.2)	25 (0.0)	3 (0.0)		65,513 (100.0)	215	15,094	80,822
160～ (%)	46,452 (98.9)	473 (1.0)	29 (0.1)			46,954 (100.0)	158	11,083	58,195
180～ (%)	17,700 (99.2)	135 (0.8)	6 (0.0)	1 (0.0)		17,842 (100.0)	80	4,302	22,224
200～ (%)	4,454 (99.4)	26 (0.6)				4,480 (100.0)	14	1,052	5,546
220～ (%)	916 (99.7)	3 (0.3)				919 (100.0)	7	234	1,160
合計 (%)	194,059 (98.7)	2,335 (1.2)	121 (0.1)	8 (0.0)		196,523 (100.0)	692	45,421	242,636
記載なし (%)	32,110 (99.0)	315 (1.0)	18 (0.1)	1 (0.0)		32,444 (100.0)	227	34,801	67,472
総計 (%)	226,169 (98.8)	2,650 (1.2)	139 (0.1)	9 (0.0)		228,967 (100.0)	919	80,222	310,108
平均	151.08	145.33	141.03	143.38		151.00	151.81	151.67	151.13
標準偏差	24.21	23.38	24.17	17.90		24.21	25.81	24.26	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査