

表 1819 腎移植の回数 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	62 (100.0)					62 (100.0)	1	13	76
2～ (%)	1,309 (99.8)	2 (0.2)				1,311 (100.0)	11	334	1,656
4～ (%)	6,264 (99.6)	25 (0.4)				6,289 (100.0)	43	1,463	7,795
6～ (%)	19,199 (99.5)	90 (0.5)	7 (0.0)	1 (0.0)		19,297 (100.0)	95	4,614	24,006
8～ (%)	36,985 (99.3)	232 (0.6)	17 (0.0)	2 (0.0)		37,236 (100.0)	133	8,746	46,115
10～ (%)	38,188 (98.8)	440 (1.1)	29 (0.1)			38,657 (100.0)	119	9,258	48,034
12～ (%)	23,533 (98.3)	405 (1.7)	13 (0.1)			23,951 (100.0)	68	5,735	29,754
14～ (%)	9,417 (97.7)	217 (2.3)	8 (0.1)			9,642 (100.0)	26	2,368	12,036
16～ (%)	3,194 (97.7)	75 (2.3)	1 (0.0)			3,270 (100.0)	7	823	4,100
合計 (%)	138,151 (98.9)	1,486 (1.1)	75 (0.1)	3 (0.0)		139,715 (100.0)	503	33,354	173,572
記載なし (%)	2,358 (99.2)	19 (0.8)				2,377 (100.0)	16	2,244	4,637
総計 (%)	140,509 (98.9)	1,505 (1.1)	75 (0.1)	3 (0.0)		142,092 (100.0)	519	35,598	178,209
平均	10.27	11.74	11.05	8.50		10.29	9.50	10.32	10.29
標準偏差	2.78	2.64	2.28	1.31		2.78	2.89	2.82	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査