

表 1824 腎移植の回数 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	124 (98.4)	2 (1.6)				126 (100.0)		20	146
1.5～ (%)	636 (99.8)	1 (0.2)				637 (100.0)	5	129	771
2.0～ (%)	2,584 (99.4)	15 (0.6)	1 (0.0)			2,600 (100.0)	17	562	3,179
2.5～ (%)	9,860 (99.5)	45 (0.5)	5 (0.1)			9,910 (100.0)	75	2,165	12,150
3.0～ (%)	41,877 (99.2)	304 (0.7)	22 (0.1)	2 (0.0)		42,205 (100.0)	177	9,700	52,082
3.5～ (%)	85,432 (99.0)	854 (1.0)	43 (0.0)	2 (0.0)		86,331 (100.0)	265	20,539	107,135
4.0～ (%)	32,010 (98.5)	455 (1.4)	15 (0.0)	1 (0.0)		32,481 (100.0)	72	7,953	40,506
4.5～ (%)	1,883 (98.0)	37 (1.9)	1 (0.1)			1,921 (100.0)	3	438	2,362
5.0～ (%)	152 (97.4)	4 (2.6)				156 (100.0)		16	172
合計 (%)	174,558 (99.0)	1,717 (1.0)	87 (0.0)	5 (0.0)		176,367 (100.0)	614	41,522	218,503
記載なし (%)	6,213 (99.2)	47 (0.8)	1 (0.0)			6,261 (100.0)	73	4,134	10,468
総計 (%)	180,771 (99.0)	1,764 (1.0)	88 (0.0)	5 (0.0)		182,628 (100.0)	687	45,656	228,971
平均	3.60	3.72	3.60	3.48		3.60	3.44	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.42	0.41	0.39		0.44	0.49	0.43	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査