

表 1831 腎移植の回数 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	5,254 (99.2)	40 (0.8)	3 (0.1)			5,297 (100.0)	30	1,127	6,454
100～ (%)	14,995 (99.1)	122 (0.8)	11 (0.1)			15,128 (100.0)	76	3,416	18,620
120～ (%)	27,634 (99.1)	228 (0.8)	10 (0.0)	1 (0.0)		27,873 (100.0)	117	6,325	34,315
140～ (%)	31,310 (99.0)	307 (1.0)	15 (0.0)	2 (0.0)		31,634 (100.0)	130	7,062	38,826
160～ (%)	25,440 (98.9)	272 (1.1)	13 (0.1)	1 (0.0)		25,726 (100.0)	107	5,750	31,583
180～ (%)	15,799 (98.7)	205 (1.3)	10 (0.1)			16,014 (100.0)	45	3,560	19,619
200～ (%)	8,128 (98.7)	105 (1.3)	6 (0.1)			8,239 (100.0)	30	1,940	10,209
220～ (%)	3,569 (98.7)	48 (1.3)				3,617 (100.0)	15	843	4,475
240～ (%)	1,404 (98.7)	17 (1.2)	2 (0.1)			1,423 (100.0)	5	305	1,733
260～ (%)	875 (98.9)	10 (1.1)				885 (100.0)	4	222	1,111
合計 (%)	134,408 (98.9)	1,354 (1.0)	70 (0.1)	4 (0.0)		135,836 (100.0)	559	30,550	166,945
記載なし (%)	46,363 (99.1)	410 (0.9)	18 (0.0)	1 (0.0)		46,792 (100.0)	128	15,106	62,026
総計 (%)	180,771 (99.0)	1,764 (1.0)	88 (0.0)	5 (0.0)		182,628 (100.0)	687	45,656	228,971
平均	154.59	160.61	155.64	151.50		154.66	150.91	155.05	154.71
標準偏差	35.23	35.00	35.87	11.79		35.23	35.92	35.49	35.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査