

表 1834 腎移植の回数 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	23 (92.0)	2 (8.0)				25 (100.0)		10	35
60～ (%)	216 (98.6)	2 (0.9)	1 (0.5)			219 (100.0)		52	271
80～ (%)	1,916 (98.6)	22 (1.1)	6 (0.3)			1,944 (100.0)	7	426	2,377
100～ (%)	10,654 (98.6)	143 (1.3)	7 (0.1)			10,804 (100.0)	49	2,302	13,155
120～ (%)	33,663 (98.7)	401 (1.2)	27 (0.1)	2 (0.0)		34,093 (100.0)	117	7,366	41,576
140～ (%)	52,016 (98.9)	547 (1.0)	14 (0.0)	2 (0.0)		52,579 (100.0)	166	11,458	64,203
160～ (%)	37,890 (99.1)	333 (0.9)	22 (0.1)			38,245 (100.0)	128	8,470	46,843
180～ (%)	14,523 (99.4)	90 (0.6)	4 (0.0)	1 (0.0)		14,618 (100.0)	57	3,327	18,002
200～ (%)	3,678 (99.5)	17 (0.5)				3,695 (100.0)	9	811	4,515
220～ (%)	716 (99.9)	1 (0.1)				717 (100.0)	4	173	894
合計 (%)	155,295 (99.0)	1,558 (1.0)	81 (0.1)	5 (0.0)		156,939 (100.0)	537	34,395	191,871
記載なし (%)	25,476 (99.2)	206 (0.8)	7 (0.0)			25,689 (100.0)	150	11,261	37,100
総計 (%)	180,771 (99.0)	1,764 (1.0)	88 (0.0)	5 (0.0)		182,628 (100.0)	687	45,656	228,971
平均	151.63	146.67	140.16	147.80		151.57	151.29	151.97	151.64
標準偏差	24.00	22.54	25.89	21.00		23.99	25.04	24.10	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査