

表 1850 腎移植の回数 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	3 (100.0)					3 (100.0)			3
2～ (%)	121 (98.4)	2 (1.6)				123 (100.0)		24	147
4～ (%)	724 (99.3)	4 (0.5)	1 (0.1)			729 (100.0)	7	182	918
6～ (%)	2,983 (98.9)	32 (1.1)	2 (0.1)			3,017 (100.0)	22	711	3,750
8～ (%)	6,986 (98.4)	108 (1.5)	5 (0.1)			7,099 (100.0)	42	1,606	8,747
10～ (%)	7,998 (97.5)	191 (2.3)	10 (0.1)			8,199 (100.0)	22	1,926	10,147
12～ (%)	5,153 (96.7)	163 (3.1)	10 (0.2)	1 (0.0)		5,327 (100.0)	17	1,294	6,638
14～ (%)	2,146 (96.3)	77 (3.5)	4 (0.2)	1 (0.0)		2,228 (100.0)	5	587	2,820
16～ (%)	775 (95.4)	37 (4.6)				812 (100.0)		236	1,048
合計 (%)	26,889 (97.6)	614 (2.2)	32 (0.1)	2 (0.0)		27,537 (100.0)	115	6,566	34,218
記載なし (%)	214 (97.7)	3 (1.4)	2 (0.9)			219 (100.0)	10	524	753
総計 (%)	27,103 (97.6)	617 (2.2)	34 (0.1)	2 (0.0)		27,756 (100.0)	125	7,090	34,971
平均	10.68	11.71	11.38	13.45		10.70	9.61	10.82	10.72
標準偏差	2.64	2.58	2.36	1.91		2.64	2.38	2.71	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査