

表 1853 腎移植の回数 nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	34 (97.1)	1 (2.9)				35 (100.0)		8	43
0.4～ (%)	902 (99.0)	9 (1.0)				911 (100.0)	6	213	1,130
0.6～ (%)	7,233 (98.7)	92 (1.3)	5 (0.1)			7,330 (100.0)	26	1,717	9,073
0.8～ (%)	11,722 (97.5)	280 (2.3)	14 (0.1)	1 (0.0)		12,017 (100.0)	54	2,809	14,880
1.0～ (%)	5,052 (96.5)	175 (3.3)	7 (0.1)	1 (0.0)		5,235 (100.0)	24	1,272	6,531
1.2～ (%)	910 (96.2)	34 (3.6)	2 (0.2)			946 (100.0)	3	218	1,167
1.4～ (%)	102 (98.1)	1 (1.0)	1 (1.0)			104 (100.0)		24	128
1.6～ (%)	9 (90.0)		1 (10.0)			10 (100.0)		3	13
1.8～ (%)	1 (100.0)					1 (100.0)			1
2.0～ (%)	4 (80.0)	1 (20.0)				5 (100.0)		1	6
合計 (%)	25,969 (97.6)	593 (2.2)	30 (0.1)	2 (0.0)		26,594 (100.0)	113	6,265	32,972
記載なし (%)	1,134 (97.6)	24 (2.1)	4 (0.3)			1,162 (100.0)	12	825	1,999
総計 (%)	27,103 (97.6)	617 (2.2)	34 (0.1)	2 (0.0)		27,756 (100.0)	125	7,090	34,971
平均	0.88	0.94	0.98	1.00		0.88	0.88	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.17	0.22	0.22		0.17	0.16	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査