

表 1855 腎移植の回数 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	8 (100.0)					8 (100.0)		2	10
1.5～ (%)	52 (96.3)	2 (3.7)				54 (100.0)		8	62
2.0～ (%)	238 (97.9)	5 (2.1)				243 (100.0)	3	48	294
2.5～ (%)	1,110 (98.9)	12 (1.1)				1,122 (100.0)	5	265	1,392
3.0～ (%)	6,964 (98.0)	126 (1.8)	12 (0.2)	1 (0.0)		7,103 (100.0)	41	1,663	8,807
3.5～ (%)	16,302 (97.8)	350 (2.1)	17 (0.1)	1 (0.0)		16,670 (100.0)	46	3,869	20,585
4.0～ (%)	5,693 (97.4)	147 (2.5)	5 (0.1)			5,845 (100.0)	7	1,306	7,158
4.5～ (%)	263 (98.5)	4 (1.5)				267 (100.0)		50	317
5.0～ (%)	16 (100.0)					16 (100.0)		2	18
合計 (%)	30,646 (97.8)	646 (2.1)	34 (0.1)	2 (0.0)		31,328 (100.0)	102	7,213	38,643
記載なし (%)	433 (97.3)	10 (2.2)	2 (0.4)			445 (100.0)	44	814	1,303
総計 (%)	31,079 (97.8)	656 (2.1)	36 (0.1)	2 (0.0)		31,773 (100.0)	146	8,027	39,946
平均	3.64	3.68	3.58	3.55		3.64	3.43	3.63	3.64
標準偏差	0.39	0.38	0.33	0.35		0.39	0.38	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査