

表 1862 腎移植の回数 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

総コレステロール 濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	791 (98.0)	16 (2.0)				807 (100.0)	2	183	992
100～ (%)	2,340 (98.4)	35 (1.5)	4 (0.2)			2,379 (100.0)	5	604	2,988
120～ (%)	4,476 (98.0)	82 (1.8)	7 (0.2)	1 (0.0)		4,566 (100.0)	3	1,125	5,694
140～ (%)	5,511 (97.7)	122 (2.2)	7 (0.1)			5,640 (100.0)	2	1,263	6,905
160～ (%)	4,772 (97.5)	118 (2.4)	4 (0.1)			4,894 (100.0)	8	1,109	6,011
180～ (%)	3,065 (97.5)	75 (2.4)	2 (0.1)			3,142 (100.0)	1	730	3,873
200～ (%)	1,791 (97.5)	44 (2.4)	1 (0.1)	1 (0.1)		1,837 (100.0)	3	413	2,253
220～ (%)	762 (98.1)	15 (1.9)				777 (100.0)		179	956
240～ (%)	298 (97.7)	6 (2.0)	1 (0.3)			305 (100.0)		79	384
260～ (%)	152 (97.4)	4 (2.6)				156 (100.0)		60	216
合計 (%)	23,958 (97.8)	517 (2.1)	26 (0.1)	2 (0.0)		24,503 (100.0)	24	5,745	30,272
記載なし (%)	7,121 (98.0)	139 (1.9)	10 (0.1)			7,270 (100.0)	122	2,282	9,674
総計 (%)	31,079 (97.8)	656 (2.1)	36 (0.1)	2 (0.0)		31,773 (100.0)	146	8,027	39,946
平均	157.94	161.78	150.81	165.50		158.01	149.04	158.01	158.00
標準偏差	35.51	34.91	34.38	60.10		35.50	36.15	36.50	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査