

表 1865 腎移植の回数 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)					2 (100.0)			2
60～ (%)	93 (95.9)	4 (4.1)				97 (100.0)		18	115
80～ (%)	501 (97.7)	12 (2.3)				513 (100.0)	6	96	615
100～ (%)	2,233 (96.3)	84 (3.6)	2 (0.1)			2,319 (100.0)	3	478	2,800
120～ (%)	6,058 (97.5)	145 (2.3)	10 (0.2)	2 (0.0)		6,215 (100.0)	25	1,399	7,639
140～ (%)	9,046 (97.8)	190 (2.1)	10 (0.1)			9,246 (100.0)	43	2,144	11,433
160～ (%)	6,550 (98.2)	112 (1.7)	6 (0.1)			6,668 (100.0)	28	1,612	8,308
180～ (%)	2,509 (98.4)	39 (1.5)	2 (0.1)			2,550 (100.0)	22	582	3,154
200～ (%)	654 (98.9)	7 (1.1)				661 (100.0)	5	156	822
220～ (%)	173 (98.9)	2 (1.1)				175 (100.0)	3	38	216
合計 (%)	27,819 (97.8)	595 (2.1)	30 (0.1)	2 (0.0)		28,446 (100.0)	135	6,523	35,104
記載なし (%)	3,260 (98.0)	61 (1.8)	6 (0.2)			3,327 (100.0)	11	1,504	4,842
総計 (%)	31,079 (97.8)	656 (2.1)	36 (0.1)	2 (0.0)		31,773 (100.0)	146	8,027	39,946
平均	150.60	143.73	146.47	130.00		150.45	155.87	151.50	150.67
標準偏差	25.12	24.71	17.82	1.41		25.13	28.69	24.55	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査