

表 1866 腎移植の回数 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	4 (100.0)					4 (100.0)	1	2	7
20～ (%)	94 (98.9)	1 (1.1)				95 (100.0)	3	23	121
40～ (%)	2,176 (98.2)	39 (1.8)	1 (0.0)	1 (0.0)		2,217 (100.0)	5	458	2,680
60～ (%)	11,969 (98.0)	227 (1.9)	12 (0.1)			12,208 (100.0)	51	2,713	14,972
80～ (%)	7,099 (97.7)	157 (2.2)	7 (0.1)	1 (0.0)		7,264 (100.0)	37	1,702	9,003
90～ (%)	4,173 (97.2)	115 (2.7)	7 (0.2)			4,295 (100.0)	19	1,003	5,317
100～ (%)	2,103 (97.6)	49 (2.3)	3 (0.1)			2,155 (100.0)	18	528	2,701
120～ (%)	139 (96.5)	5 (3.5)				144 (100.0)	1	24	169
140～ (%)	11 (100.0)					11 (100.0)		1	12
合計 (%)	27,768 (97.8)	593 (2.1)	30 (0.1)	2 (0.0)		28,393 (100.0)	135	6,454	34,982
記載なし (%)	3,311 (98.0)	63 (1.9)	6 (0.2)			3,380 (100.0)	11	1,573	4,964
総計 (%)	31,079 (97.8)	656 (2.1)	36 (0.1)	2 (0.0)		31,773 (100.0)	146	8,027	39,946
平均	79.01	80.90	80.57	70.50		79.05	80.32	79.67	79.17
標準偏差	14.71	14.88	12.94	20.51		14.72	17.81	14.55	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査